

わかった場合には、直ちに医師、薬剤師又は看護師に相談してください。

➤ 本剤を服用中及び最終服用後2週間は授乳を避けることが望ましいです。

## ● 予想される副作用

本剤の安全性に関して得られている情報は限られていますが、これまでによくみられている副作用は、次のとおりです。

<ul style="list-style-type: none"><li>● 発疹</li><li>● そう痒</li><li>● 悪心</li><li>● 嘔吐</li><li>● 下痢</li><li>● 腹部不快感</li><li>● 頭痛</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 脂質異常症</li><li>● HDL コレステロール低下</li><li>● トリグリセリド上昇</li><li>● ビリルビン上昇</li><li>● 血中コレステロール低下</li><li>● 血清鉄上昇</li></ul>
--	---

まだ知られていない副作用やリスクがあるかもしれません。これまでに報告されていない症状・疾患があらわれる可能性もありますので、異常を感じた場合には、担当の医師、薬剤師又は看護師にご相談ください。

## 2. 同意及び情報提供に関する特記事項

本剤は、説明を受けてその内容を理解・同意していただいた後に処方されます。本剤による治療は、自由意思によって決めることができます。本剤による治療を断っても、日常の治療や看護で不利益を被ることはありません。本剤を含まない他の適切な治療を受けることができます。

また、本剤による治療を受けることに同意した後に、考えが変わった場合には、いつでもこの同意を取り下げ（同意の撤回）、本剤による治療を中止することができます。その場合も、その他の治療において不利益を受けることはありません。同意を取り下げる場合には、担当の医師、薬剤師又は看護師にお知らせください。

本剤による治療を受けた際に、もし何らかの異常を感じた場合には担当の医師、薬剤師又は看護師にお知らせください。あなたからの情報は医師、薬剤師、看護師を通じて国や製薬企業（塩野義製薬株式会社）に提供され、有効性や安全性を評価するためのほか、適正使用の実態を把握するために使用されることがあります。